

Traqueo-bronquitis infecciosa canina, tos en los perros o comúnmente llamada tos de las perreras

Por: Dra. Paulina Valero
Especialista en Medicina Respiratoria

Se manifiesta con tos seca, a veces puede presentar arcada con expectoración final (secreción), los tutores suelen confundir con vomito o presencia de algún cuerpo extraño.

Al realizar el examen clínico por un médico veterinario, se puede observar que al comprimir la tráquea se produce reflejo tusígeno positivo (desencadena mucha tos).

Factores que lo puede desencadenar:

- Por hacinamiento (Muchos animales en un mismo lugar, sin condiciones ambientales adecuadas)
- Falta de higiene en el ambiente o de la mascota,
- Falta de vacunación anual y desparasitación
- Frio
- Esta enfermedad es altamente contagiosa



Factor de agentes etiológicos primarios:

- El principal implicado puede ser la bacteria llamada Bordetella bronchiseptica, una bacteria Gram(-),
- Puede ser un virus de la familia parainfluenza
- O puede ser un Adenovirus tipo 2 (AVC-2)

** Uno o más de un agente pueden ser los iniciadores o complicantes que causen esta enfermedad.

Tratamiento:

La decisión de tratar o no depende de algunos factores asociados a la condición del paciente o la gravedad de la manifestación de los signos clínicos que debe ser evaluada por el médico veterinario. Entre los tratamientos más utilizados son:

- Antibióticos,
- Corticoides,
- Inmunoestimulantes,
- Complejos vitamínicos,
- Reposo relativo,
- No uso de correa y collar que tense el cuello y tráquea.

Profilaxis - Precauciones para evitar la enfermedad:

- Cuidado del frío,
- Tenencia responsable,
- Vacunación y desparasitación al día,
- Buenas condiciones de higiene,
- Buena alimentación.